ПАТОМОРФОЛОГИЯ БИЛИАРНОЙ АТРЕЗИИ У ДЕТЕЙ – РЕЦИПИЕНТОВ ДОНОРСКОЙ ПЕЧЕНИ

Ирышкин О.Е.¹, Ильинский И.М.^{1, 2}, Цирульникова О.М.^{1, 2}, Готье С.В.^{1, 2}

¹ ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России (директор – академик РАМН, проф. С.В. Готье), Москва, Российская Федерация

² Кафедра трансплантологии и искусственных органов (зав. – академик РАМН, проф. С.В. Готье) ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (ректор – член-корр. РАМН, проф. П.В. Глыбочко), Москва, Российская Федерация

Цель работы. Изучение клинико-морфологических особенностей билиарной атрезии у детей – реципиентов донорской печени, которым выполнили операцию Kasai, по сравнению с пациентами, которым такое оперативное вмешательство не проводилось. **Материал и методы.** Проанализированы истории болезни и проведено гистологическое исследование удаленной печени 49 детей, страдавших билиарной атрезией, и которым была проведена трансплантация фрагмента печени. Были сформированы две группы: 1-я – 21 ребенок с билиарной атрезией, которым портоэнтеростомия не выполнялась, и 2-я – 28 детей, которым проводилась операция Kasai до трансплантации печени. **Результаты.** При изучении патоморфологической картины печени установлены характерные особенности в структуре пролиферирующих желчных протоков: отек и дистрофические изменения холангиоцитов у пациентов первой группы ($p = 0,035$) и склеротические изменения стенки желчных протоков с исчезновением эпителиальной выстилки у пациентов второй группы ($p = 0,01$). Также обнаружена статистически достоверная более высокая активность воспалительного процесса в печени у пациентов первой группы ($p = 0,02$). **Заключение.** На основании проведенного нами исследования можно утверждать, что операция Kasai не предотвращает фиброзирование внутрипеченочных желчных протоков и развитие фиброза, а затем и цирроза печени.

Ключевые слова: билиарная атрезия, портоэнтеростомия, желчные протоки, цирроз печени.

PATHOMORPHOLOGY OF BILIARY ATRESIA IN CHILDREN – RECIPIENT OF LIVER

Iryshkin O.E.¹, Iljinsky I.M.^{1, 2}, Tsirulnikova O.M.^{1, 2}, Gautier S.V.^{1, 2}

¹Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs (Director – academic of RAMSci, prof. S.V. Gautier), Moscow, Russian Federation

²Chair of transplantology and artificial organs (Head – academician of RAMSci, prof. S.V. Gautier) I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Rector – corresponding member of RAMSci, prof. P.V. Glybochko), Moscow, Russian Federation

Aim of the work. Clinical and morphological research of the features of biliary atresia at children-recipients of liver, to whom a portoenterostomy was made in comparison with patients to whom such surgery wasn't carried out. **Materials and methods.** Clinical records and histological research of liver of 49 children suffering a biliary atresia are analyzed. Two groups were created: the 1st group – 21 children without portoenterostomy before liver transplantation and 2nd group – 28 children with portoenterostomy before liver transplantation. **Results.** Pathomorphology of liver the characteristics in structure of proliferation bile ducts are established: hypostasis and dystrophic changes of cholangiocytes at patients of the first group ($p = 0,035$) and sclerosis of bile ducts with disappearance of an epithelium at patients of the second group ($p = 0,01$). In first group of children activity of inflammatory process in liver were significantly higher than in second group ($p = 0,02$). **Conclusion.** Our experience has demonstrated that portoenterostomy doesn't prevent fibrosis of intrahepatic bile ducts and development of fibrosis, and then a development of cirrhosis.

Key words: biliary atresia, portoenterostomy, bile ducts, cirrhosis.

Билиарная атрезия – заболевание, которое характеризуется облитерацией внепеченочных и внутрипеченочных желчевыводящих протоков и приводит, при отсутствии лечения, к вторичному билиарному циррозу [1].

Этиопатогенез этого заболевания остается до конца не ясным. Существует несколько взглядов на механизм развития билиарной атрезии [1–3]. Она может возникать как изолированное поражение, так и в сочетании с различными типами врожденных

аномалий внутренних органов [3, 4]. В связи с этим выделяют две формы билиарной атрезии: эмбриональную (синонимы: врожденная, синдромальная) и перинатальную (синонимы: несиндромальная, приобретенная) [1, 4].

Синдромальная билиарная атрезия встречается относительно редко, в пределах 10–20% наблюдений [5, 6]. Эту форму билиарной атрезии связывают с патологическим морфогенезом билиарного дерева из-за мутации генов, регулирующих развитие желчных протоков [3]. Характерные аномалии развития внутренних органов у пациентов с билиарной атрезией описаны в литературе [4, 7]. Так, синдромальные формы билиарной атрезии были изучены Silveira с соавт.: из 47 пациентов с синдромальной формой билиарной атрезии у 28 имели место сердечно-сосудистые аномалии, у 22 – аномалии органов брюшной полости и у 19 – аномалии селезенки) [7].

Однако большинство пациентов с билиарной атрезией имеют перинатальную форму, при которой билиарная система развивается нормально, однако в конце беременности или сразу после рождения подвергается воспалению и последующему фиброзу, приводящему к облитерации желчевыводящих путей [7]. На несиндромальную форму билиарной атрезии приходится 80–90% наблюдений [1, 5].

В настоящее время хирургическое лечение билиарной атрезии включает в себя один или два этапа: операцию Kasai – паллиативную портотомию, осуществляемую в неонатальном периоде, и/или трансплантацию печени [8, 9].

Вместе с тем, несмотря на успешную операцию Kasai, прогрессирующее воспаление и фиброз внутривнутрипеченочных желчных протоков в той или иной степени развиваются у большинства пациентов, и большинству больных с билиарной атрезией (70–80%) в конечном счете требуется трансплантация печени, причем примерно половине из них – в течение первых двух лет жизни [10, 11].

В настоящее время в литературе широко описаны клиническая картина, методы диагностики, а также методы лечения билиарной атрезии. Проанализировано влияние портотомии на последующее течение заболевания и его прогноз [5]. Также встречаются работы, посвященные влиянию портотомии на результаты трансплантации печени [12].

Вместе с тем в литературе остаются неосвещенными патоморфологические особенности билиарной атрезии на конечной стадии заболевания, когда пациентам требуется трансплантация печени. Также отсутствуют сведения о патоморфологических особенностях билиарной атрезии у пациентов после операции Kasai на этапе перед трансплантацией печени. Эти вопросы определили цель настоящего исследования.

Цель настоящей работы – изучить патоморфологические особенности билиарной атрезии у детей – реципиентов донорской печени, которым выполнили операцию Kasai, по сравнению с пациентами, у которых такое оперативное вмешательство отсутствовало.

Ирышкин Олег Евгеньевич – врач патологоанатомического отделения ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава РФ (директор – академик РАМН, проф. С.В. Готье), Москва, Российская Федерация. *Ильинский Игорь Михайлович* – д. м. н., заведующий отделом клинической патологии того же центра, профессор кафедры трансплантологии и искусственных органов ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (ректор – член-корр. РАМН, профессор П.В. Глыбочко), Москва, Российская Федерация. *Цирульникова Ольга Мартеновна* – д. м. н., главный научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии и трансплантации того же центра, профессор кафедры трансплантологии и искусственных органов ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (ректор – член-корр. РАМН, профессор П.В. Глыбочко), Москва, Российская Федерация. *Готье Сергей Владимирович* – академик РАМН, профессор, директор ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова», Москва, Российская Федерация; заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (ректор – член-корр. РАМН, профессор П.В. Глыбочко), Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Ирышкин Олег Евгеньевич. Адрес: 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 1.

Телефон: +7-968-856-81-77. E-mail: olegiryshkin@mail.ru

Iryshkin Oleg Yevgenievich – doctor of department of pathology, Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Moscow, Russian Federation. *Ilyinsky Igor Mikhailovich* – doct. of med. sci., Head of department of pathology at the same center, professor of Transplantology and artificial organs: I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (rector – corresponding member of RAMSci prof. P.V. Glybochko), Moscow, Russian Federation. *Tsirulnikova Olga Martenovna* – doct. of med. sci., main scientific member of department of abdominal surgery and transplantology at the same center, professor Department of Transplantology and artificial organs at the same University. *Gautier Sergey Vladimirovich* – Academicians of the Russian Academy of Medical Sciences, director of Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs. Head Department of Transplantology and artificial organs: I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (rector – corresponding member of RAMSci prof. P.V. Glybochko), Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Iryshkin Oleg Yevgenievich. Address: Apt. 1, Schukinskaya Str., Moscow, 123182.

Tel. +7-968-856-81-77. E-mail: olegiryshkin@mail.ru

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы истории болезни, и проведено гистологическое исследование удаленной печени 49 детей (17 мальчиков, 32 девочки), страдавших билиарной атрезией, которым была проведена трансплантация фрагмента печени. Обследование пациентов и трансплантация печени в период с мая 2008 года по август 2012 года выполнены в ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.

В зависимости от выполнения или невыполнения пациентам портоэнтеростомии были сформированы две группы:

1-я группа – 21 ребенок (7 мальчиков, 14 девочек) в возрасте от 4 до 11 месяцев (средний возраст $6,4 \pm 0,49$ месяца) с билиарной атрезией, без предшествующей операции Касаи.

2-я группа – 28 детей (10 мальчиков, 18 девочек) в возрасте от 5 месяцев до 7,5 года (средний возраст $14,9 \pm 3,25$ месяца), которым была выполнена операция Касаи. В основном возраст пациентов составлял от пяти месяцев до одного года ($n = 21$), гораздо меньше было пациентов в возрасте от одного года до трех с половиной лет ($n = 5$), и только возраст одного ребенка достиг 7,5 года.

Морфологические методы исследования включали в себя: макроскопическое описание и гистологическое исследование образцов удаленной печени пациентов. Гистологический материал фиксировали в 10% забуференном формалине (рН 6,8–7), обезвоживали в спиртах восходящей крепости, заливали в парафиновые блоки, из которых готовили срезы толщиной 4–5 мкм на микротоме фирмы Leica RM 2145. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, трихромом по Массону, а также проводили PAS-реакцию. Изучение гистологических срезов осуществляли с помощью микроскопа Leica DM6000 B. Выраженность воспалительно-деструктивных изменений в удаленной печени оценивали с использованием индекса гистологической активности хронического гепатита по Knodell, а также оценивали дистрофические изменения в гепатоцитах, степень выраженности интрацеллюлярного и протокового холестаза, наличие или отсутствие гигантоклеточной трансформации гепатоцитов, выраженность дуктопии и/или пролиферации желчных протоков в портальных трактах и фиброзных септах. Для оценки степени фиброза использовали индекс Desmet.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета статистических программ Statistica 7.0 (Statsoft). Сравнение двух независимых групп осуществляли непараметрическими методами. Для анализа количественных данных использовали U-критерий Манна–Уитни. Для анализа качественных признаков применяли критерий χ^2 .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании билиарная атрезия чаще встречалась у девочек (65,3%), чем у мальчиков (34,7%), что соответствует данным литературы [11]. Возраст детей, которым не проводилась операция Касаи, колебался от 4 до 11 месяцев (средний возраст $6,4 \pm 0,49$ месяца), а возраст детей второй группы, которым была проведена портоэнтеростомия в предтрансплантационный период, был в пределах от 5 месяцев до 7,5 года и в среднем составлял $14,9 \pm 3,25$ месяца ($p = 0,006$). При этом на момент проведения операции Касаи возраст детей был от 23 до 186 дней и в среднем составлял $79,4 \pm 6,71$ дня.

Среди пациентов с билиарной атрезией преобладала несиндромальная форма ($n = 46$; 93,9%), а синдромальный вариант был выявлен только у трех из 49 пациентов (6,1%). У них была дольчатая селезенка и аномалии нижней полой вены (отсутствие печеночного сегмента нижней полой вены, с наличием замещающего сосуда – *v. azygos*; печеночные вены сливались в один короткий фрагмент нижней полой вены под диафрагмой). У одного пациента была выявлена аномалия развития толстой кишки (обратное расположение: нисходящий отдел – справа, восходящий – слева; брыжейка на всем протяжении толстой кишки – мобильная; связка *Treitz* – справа от позвоночника). У второго пациента было выявлено неполное обратное расположение органов брюшной полости: правостороннее расположение желудка, нисходящей ободочной и сигмовидной кишки и селезенки; поджелудочная железа смещена влево. И у третьего больного ребенка определялись левостороннее расположение печени и правостороннее расположение селезенки. В связи с небольшим количеством наблюдений синдромальной формы мы не проводили сравнение этого варианта с несиндромальной билиарной атрезией.

Результаты гистологического исследования удаленной нативной печени детей-реципиентов с билиарной атрезией в зависимости от факта выполнения им операции Касаи представлены в таблице.

Общая патоморфологическая картина печени детей с билиарной атрезией характеризуется воспалительным повреждением наружных и внутриспеченочных желчных протоков, склерозом их стенок, а также сужением и облитерацией их просветов [13, 14]. К наиболее типичным гистологическим признакам при билиарной атрезии относятся: холестаз, перипортальная пролиферация желчных протоков, а также портальный и перилобулярный отек и фиброз [15].

Изучение морфологической картины печени у детей как без операции Касаи в анамнезе, так и с ее наличием не показало статистически значимых различий в выраженности внутриклеточного холестаза, а также в желчных капиллярах и желчных протоках.

Таблица

Основные морфологические признаки удаленной печени у детей с билиарной атрезией в зависимости от факта проведения операции Kasai

Признак	Первая группа. Операция Kasai не выполнялась (n = 21)	Вторая группа. Операция Kasai выполнялась (n = 28)	p
Активность воспаления по Knodell, баллы	3,3 ± 0,52	2 ± 0,34	0,02
Перипортальные и мостовидные некрозы	13	8	0,041
Внутридольковые фокальные некрозы и баллонная дистрофия гепатоцитов	10	13	0,84
Воспалительная инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ:	18	15	0,04
мононуклеарная	18	15	0,04
полинуклеарная	4	1	0,2
Степень выраженности фиброза по Desmet, баллы:	3,9 ± 0,07	3,96 ± 0,04	0,7
многочисленные септы без цирроза (3 балла)	2	1	0,8
цирроз (4 балла)	19	27	0,8
Перисинусоидальный фиброз	3	11	0,11
Склероз стенки центральных вен	14	25	0,1
Пролиферация желчных протоков	21	28	–
Различия в структуре пролиферированных желчных протоков:			
дистрофия и отек холангиоцитов	14	9	0,035
фиброз стенки желчных протоков с исчезновением эпителиальной выстилки	11	25	0,01
Пролиферация клеток желчного эпителия, формирующих «дуктулоподобные структуры»	2	4	0,95
Дистрофия и склероз интимы артерий портальных трактов	1	5	0,34
Степень выраженности холестаза:			
застой желчи внутриклеточно	16	16	0,3
застой желчи в желчных капиллярах.	16	16	0,3
застой желчи в желчных протоках	18	21	0,57
деструкция стенки желчных протоков и формирование «желчных озер»	7	11	0,8
Белковая дистрофия гепатоцитов	14	19	0,83
Жировая дистрофия гепатоцитов	2	4	0,9
Гигантоклеточная трансформация гепатоцитов	6	8	0,75
Кольцевидное распределение хроматина в ядрах гепатоцитов, «песочные ядра»	7	6	0,54
Расширение и полнокровие синусоидов	18	26	0,73
Псевдотубулы, образованные гепатоцитами	3	7	0,57

Не выявлено различий в частоте деструктивных изменений стенки желчных протоков с выходом желчи в окружающие ткани и формированием «желчных озер». Так, «желчные озера» были обнаружены у семи пациентов (33,3%) первой группы и одиннадцати больных (39,3%) второй группы.

У всех пациентов с билиарной атрезией отмечалась пролиферация желчных протоков, однако их структура у детей без предшествующей портоэнтеростомии и пациентов с операцией Kasai в анамнезе была различной.

Отек и дистрофические изменения холангиоцитов достоверно чаще встречались у пациентов без оперативных вмешательств в анамнезе ($p = 0,035$). На рис. 1а видны пролиферирующие желчные про-

токи у ребенка с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai. Форма желчевыводящих протоков не изменена, однако имеются отек и дистрофические изменения холангиоцитов. В некоторых желчных протоках этой же группы пациентов встречаются выраженные дистрофические изменения холангиоцитов, с секвестрацией их в просвет канальцев.

В группе больных детей с портоэнтеростомией в анамнезе большинство желчных протоков были фиброзированы, при этом эпителиальная выстилка их отсутствовала (рис. 1б). Эти различия являются статистически достоверными ($p = 0,01$).

Отметим, что у двух пациентов (9,5%) первой группы и четырех больных (14,3%) второй группы

Рис. 1. Проплиферация желчных протоков: а – с отеком и дистрофическими изменениями холангиоцитов у девочки пяти месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ № 1207-10); б – склероз стенки и исчезновение эпителиальной выстилки желчных протоков в септе у девочки 12 месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 3984-86). Окраска трихромом по Массону. $\times 400$

в фиброзных септах были выявлены единичные группы клеток, напоминающие желчный эпителий; в среднем – у 12,3% детей. По данным же литературы, этот патоморфологический признак при билиарной атрезии встречается с частотой от 14 [14] до 51% [16].

Степень гистологической активности оценивали в баллах с использованием индекса Knodell. Были получены статистически значимые отличия в степени активности воспалительно-деструктивных изменений у пациентов данных групп ($p = 0,02$). У пациентов первой группы было более частое формирование перипортальных и мостовидных некрозов (рис. 2а), чем у пациентов второй группы (рис. 2б) ($p = 0,041$). Отметим, что воспалительно-деструктивные изменения также были более выра-

женными в первой группе. Достоверные отличия были получены и в отношении воспалительной инфильтрации печени ($p = 0,04$). Воспаление портальных трактов и фиброзных септ имелось у 18 пациентов (85,7%) с билиарной атрезией без предшествующей операции (рис. 3а) и у 15 больных (53,5%) с предшествующей портоэнтеростомией (рис. 3б). В обеих группах воспалительный инфильтрат в основном был представлен лимфоцитами и в меньшей степени нейтрофилами и плазматическими клетками, что свидетельствует о хроническом характере воспалительного процесса. Суммарная оценка гистологической активности по Knodell в обеих группах была слабовыраженной.

В нашем исследовании цирроз печени был выявлен у подавляющего большинства пациентов

Рис. 2. Деструкция печеночных долек: а – обширный некроз печеночной дольки у мальчика шести месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ № 1776-77); б – перипортальный некроз у девочки 12 месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 5758-60). Окраска гематоксилином и эозином. $\times 100$

Рис. 3. Инфильтрация фиброзных септ: а – выраженная инфильтрация фиброзной септы. В составе инфильтрата нейтрофилы, плазматические клетки и лимфоциты у девочки восьми месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ № 2034-36); б – слабая лимфоидноклеточная инфильтрация фиброзной септы у девочки 17 месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 8640-42). Окраска гематоксилином и эозином. ×400

Рис. 4. Цирроз печени: а – у мальчика восьми месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ № 5974-82); б – у девочки одного года с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 5758-60). Окраска трихромом по Массону. ×100

с билиарной атрезией как без предшествующего оперативного вмешательства на желчевыводящих протоках (рис. 4а), так и с предшествующей операцией Kasai (рис. 4б). Эти результаты совпадают с исследованиями L.M. Mask с соавт., которые отметили, что, несмотря на успешную операцию Kasai, происходит прогрессирующая облитерация внутрипеченочных желчных протоков с последующим развитием цирроза печени [3].

По данным литературы, предиктором неблагоприятного исхода портоэнтеростомии являются такие структурные особенности печени, как поражение внутрипеченочных желчных протоков, наличие фиброза и отсутствие билиарных протоков в области ворот печени [14, 17].

Нами было выявлено формирование перисинусоидального фиброза у трех пациентов (14,2%) первой группы и у одиннадцати больных с предшествующей операцией Kasai (39,2%), однако различия в частоте данного признака статистически не достоверны. Также достоверных различий не было выявлено при сравнении такого морфологического признака, как склероз интимы артерий портальных трактов.

У пациентов с билиарной атрезией были обнаружены такие гистологические признаки, как гигантоклеточная трансформация гепатоцитов, кольцевидное распределение хроматина в ядрах гепатоцитов («песочные ядра»), белковая и жировая дистрофия гепатоцитов, расширение и полнокро-

вие синусоидов, а также псевдотубулы, образованные гепатоцитами и содержащие желчь. Данные признаки почти в равной степени встречались у пациентов как первой, так и второй группы. Однако описанные морфологические изменения не являются специфичными для билиарной атрезии и, по данным литературы, могут встречаться при других холестатических заболеваниях печени [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при изучении патоморфологической картины печени двух групп пациентов с билиарной атрезией установлены характерные особенности в структуре пролиферирующих желчных протоков: отек и дистрофические изменения холангиоцитов у пациентов первой группы и склеротические изменения стенки желчных протоков с исчезновением эпителиальной выстилки у пациентов второй группы. Также обнаружена статистически достоверная более высокая активность воспалительного процесса в печени у пациентов первой группы. На основании проведенного нами исследования можно утверждать, что операция Kasai не предотвращает фиброзирование внутрипеченочных желчных протоков и развитие фиброза, а затем и цирроза печени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Burt A.D., Portmann B.C., Ferrell L.D. MacSween's Pathology of the Liver 5th. ed. Churchill Livingstone. 2006: 992.
2. Wildhaber B.E. Biliary atresia: 50 years after the first Kasai. *ISRN surgery*. – 2012.
3. Mack L.M., Sokol R.J. Unraveling the Pathogenesis and Etiology of Biliary Atresia. *Pediatric Research*. 2005; 57: 87–94.
4. Broniszczak D., Apanasiewicz A., Czubkowski P., Kalicinski P., Ismail H., Ostoja-Chyzynska A., Markiewicz-Kijewska. Liver transplantation in children with biliary atresia and polysplenia syndrome. *Ann. Transplant*. 2011; 16: 14–17.
5. Chardot C. Biliary atresia. *Orphanet Journal of Rare Diseases*. 2006; 1: 1–28.
6. Howard E.N., Stringer M.D., Colombani P.M. Surgery of the Liver, Bile duct and Pancreas in Children. *London. Arnold*. 2002: 572.
7. Silveira T.R., Salzano F.M., Howard E.R., Mowat A.P. Congenital structural abnormalities in biliary atresia: evidence for etiopathogenic heterogeneity and therapeutic implications. *Acta Paediatr. Scand*. 1991; 80: 1192–1199.
8. Oetzmann von Sochaczewski C., Petersen C., Ure B.M., Osthaus A., Schubert K.P., Becker T., Lehner F., Kuebler J.F. Laparoscopic versus conventional kasai portoenterostomy does not facilitate subsequent liver transplantation in infants with biliary atresia. *J. Laparosc. Adv. Surg*. 2012; 22: 408–411.

9. Pakarinen M.P., Rintala R.J. Surgery of biliary atresia. *Scand. J. Surg*. 2011; 100: 49–53.
10. Davenport M. Biliary atresia. *Semin. Pediatr. Surg*. 2005; 14: 42–48.
11. Carmi R., Magee C.A., Neill C.A., Karrer F.M. Extrahepatic biliary atresia and associated anomalies: etiologic heterogeneity suggested by distinctive patterns of associations. *Am. J. Med. Genet*. 1993; 45: 683–693.
12. Alpert L.I., Strauss I., Hirschorn K. Neonatal hepatitis and biliary atresia associated with trisomy 17–18. *N. Engl. J. Med*. 1969; 280: 16–20.
13. Kasai M., Watanabe I., Ohi R. Follow-up studies of long-term survivors after hepatic portoenterostomy for 'non-correctable' biliary atresia. *J. Pediatr. Surg*. 1975; 10: 173–182.
14. Mack C.L. The pathogenesis of biliary atresia: evidence for a virus-induced autoimmune disease. *Semin. Liver Dis*. 2007; 27: 233–242.
15. Chardot C., Carton M., Spire-Bendelac N., Le Pommellet C., Golmard J.L., Auvert B. Prognosis of biliary atresia in the era of liver transplantation: French national study from 1986 to 1996. *Hepatology*. 1999; 30: 606–611.
16. Gurta L., Gupta S.D., Bhatnagar V. Extrahepatic biliary atresia: Correlation of histopathology and liver function tests with surgical outcomes. *J. Indian Assoc. Pediatr. Surg*. 2012; 17 (4): 147–152.
17. Yamaquti D.C., Patricio F.R. Morphometrical and immunohistochemical study of intrahepatic bile ducts in biliary atresia. *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol*. 2011; 23: 759–765.
18. Roy P., Chatterjee U., Ganguli M., Banerjee S., Chatterjee S.K., Basu A.K. A histopathological study of liver and biliary remnants with clinical outcome in cases of extrahepatic biliary atresia. *Indian J. Pathol. Microbiol*. 2010; 53: 101–105.
19. Balistreri W.F., Grand R., Hoofnagle J.H., Suchy F.J., Ryckman F.C., Perlmutter D.H., Sokol R.J. Biliary Atresia: Current Concepts and Research Directions Summary of a Symposium. *Hepatology*. 1996; 23: 1682–1692.
20. Awasthi A., Das A., Srinivasan R., Joshi K. Morphological and immunohistochemical analysis of ductal plate malformation: correlation with fetal liver. *Histopathology*. 2004; 45: 260–267.
21. McKiernan P.J., Baker A.J., Kelly D.A. The frequency and outcome of biliary atresia in the UK and Ireland. *Lancet*. 2000; 355: 25–29.

REFERENCES

1. Burt A.D., Portmann B.C., Ferrell L.D. MacSween's Pathology of the Liver 5th. ed. Churchill Livingstone. 2006: 992.
2. Wildhaber B.E. Biliary atresia: 50 years after the first Kasai. *ISRN surgery*. – 2012.
3. Mack L.M., Sokol R.J. Unraveling the Pathogenesis and Etiology of Biliary Atresia. *Pediatric Research*. 2005; 57: 87–94.
4. Broniszczak D., Apanasiewicz A., Czubkowski P., Kalicinski P., Ismail H., Ostoja-Chyzynska A., Markiewicz-Kijewska. Liver transplantation in children with biliary

- atresia and polysplenia syndrome. *Ann. Transplant.* 2011; 16: 14–17.
5. Chardot C. Biliary atresia. *Orphanet Journal of Rare Diseases.* 2006; 1: 1–28.
 6. Howard E.N., Stringer M.D., Colombani P.M. Surgery of the Liver, Bile duct and Pancreas in Children. *London. Arnold.* 2002: 572.
 7. Silveira T.R., Salzano F.M., Howard E.R., Mowat A.P. Congenital structural abnormalities in biliary atresia: evidence for etiopathogenic heterogeneity and therapeutic implications. *Acta. Paediatr. Scand.* 1991; 80: 1192–1199.
 8. Oetzmann von Sochaczewski C., Petersen C., Ure B.M., Osthaus A., Schubert K.P., Becker T., Lehner F., Kuebler J.F. Laparoscopic versus conventional kasai portoenterostomy does not facilitate subsequent liver transplantation in infants with biliary atresia. *J. Laparoendosc. Adv. Surg.* 2012; 22: 408–411.
 9. Pakarinen M.P., Rintala R.J. Surgery of biliary atresia. *Scand. J. Surg.* 2011; 100: 49–53.
 10. Davenport M. Biliary atresia. *Semin. Pediatr. Surg.* 2005; 14: 42–48.
 11. Carmi R., Magee C.A., Neill C.A., Karrer F.M. Extrahepatic biliary atresia and associated anomalies: etiologic heterogeneity suggested by distinctive patterns of associations. *Am. J. Med. Genet.* 1993; 45: 683–693.
 12. Alpert L.I., Strauss I. Hirschorn K. Neonatal hepatitis and biliary atresia associated with trisomy 17–18. *N. Engl. J. Med.* 1969; 280: 16–20.
 13. Kasai M., Watanabe I., Ohi R. Follow-up studies of long-term survivors after hepatic portoenterostomy for ‘non-correctable’ biliary atresia. *J. Pediatr Surg.* 1975; 10: 173–182.
 14. Mack C.L. The pathogenesis of biliary atresia: evidence for a virus-induced autoimmune disease. *Semin. Liver Dis.* 2007; 27: 233–242.
 15. Chardot C., Carton M., Spire-Bendelac N., Le Pommelet C., Golmard J.L., Auvert B. Prognosis of biliary atresia in the era of liver transplantation: French national study from 1986 to 1996. *Hepatology.* 1999; 30: 606–611.
 16. Gurta L., Gupta S.D., Bhatnagar V. Extrahepatic biliary atresia: Correlation of histopathology and liver function tests with surgical outcomes. *J. Indian Assoc. Pediatr. Surg.* 2012; 17 (4): 147–152.
 17. Yamaquti D.C., Patricio F.R. Morphometrical and immunohistochemical study of intrahepatic bile ducts in biliary atresia. *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* 2011; 23: 759–765.
 18. Roy P., Chatterjee U., Ganguli M., Banerjee S., Chatterjee S.K., Basu A.K. A histopathological study of liver and biliary remnants with clinical outcome in cases of extrahepatic biliary atresia. *Indian J. Pathol. Microbiol.* 2010; 53: 101–105.
 19. Balistreri W.F., Grand R., Hoofnagle J.H., Suchy F.J., Ryckman F.C., Perlmutter D.H., Sokol R.J. Biliary Atresia: Current Concepts and Research Directions Summary of a Symposium. *Hepatology.* 1996; 23: 1682–1692.
 20. Awasthi A., Das A., Srinivasan R., Joshi K. Morphological and immunohistochemical analysis of ductal plate malformation: correlation with fetal liver. *Histopathology.* 2004; 45: 260–267.
 21. McKiernan P.J., Baker A.J., Kelly D.A. The frequency and outcome of biliary atresia in the UK and Ireland. *Lancet.* 2000; 355: 25–29.